

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka z polietylenu z zakrętką polietylenową

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Glukoza,
100 g/100 g, proszek doustny, proszek do sporządzania roztworu doustnego
Glucosum anhydricum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład

1 g proszku zawiera 1 g glukozy bezwodnej.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek doustny

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

50 g kod: 5909990959228

75 g kod: 5909990959235

80 g kod: 5909990959242

100 g kod: 5909990959259

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety butelki przed zastosowaniem leku, w tym celu należy odkleić etykietę w prawym dolnym rogu w miejscu oznaczonym strzałką.

Podanie doustne.

Dawkowanie:

Proszek doustny

Doraźnie w stanach wyczerpania po wysiłkach, można przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5g-20g).

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Doustny test tolerancji glukozy: Po wykonaniu oznaczenia glukozy we krwi na czczo, 75 g glukozy rozpuścić w szklance wody (200-300 ml), roztwór wypić w ciągu 3-5 min. Następnie oznaczenia glukozy wykonuje się po 120 minutach.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie wg wskazań lekarza.

Przeciwwskazania

Zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Interakcje

Nie znane.

Ciąża i karmienie piersią

Przed użyciem skonsultować z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie

Przyjęcie jednorazowo dużej ilości glukozy może spowodować nudności i wymioty.

Działania niepożądane

Przy właściwym stosowaniu nie są znane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Nie dotyczy.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

Polska
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań
tel. +48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.
Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. +48 52 386 73 10, fax +48 52 386 73 23

(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 19879

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie

Glukoza jest cukrem niezbędnym dla człowieka i źródłem energii. Po podaniu doustnym glukoza łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkłada się w wątrobie, w postaci glikogenu. Działa również moczopędnie.

Wskazania

Stany hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą (np. po przedawkowaniu insuliny), stany niedoborów węglowodanów, stany wyczerpania po długotrwałych wysiłkach; poza tym wg wskazań lekarskich (np. w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy).

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Glukoza

17. NIEPOTWARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOTWARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy